

Hable con su proveedor de atención médica sobre la posibilidad de tomar medicamentos para curar la hepatitis C.

Una vez que se haya curado, no necesitará volver a tomar medicamentos contra la hepatitis C y, como ya no tendrá la enfermedad, no podrá contagiar a nadie más.




PARA OBTENER REFERENCIAS, VISITE AIDSETC.ORG

Adaptado de:
Departamento de Salud pública de la ciudad de Filadelfia
Get Cured! Understanding the New Era of Hep C Treatment.
Enero de 2019

Hepatitis C:

Curarse
es
más
fácil
que nunca

En el pasado: El tratamiento contra la hepatitis C duraba hasta un año, provocaba efectos secundarios adversos y, en el mejor de los casos, curaba a un 50 % de las personas. Las personas con VIH y hepatitis C tenían menos probabilidades de curarse que las que solo tenían hepatitis C.



¡Como mínimo un 90 % de tasa de curación!

Ahora: El nuevo tratamiento contra la hepatitis C dura unos 3 meses, tiene pocos o ningún efecto secundario y cura como mínimo al 90 % de las personas. Los medicamentos contra la hepatitis C funcionan tanto para las personas que viven con VIH y hepatitis C como para las que solo tienen hepatitis C.

EN EL PASADO		AHORA
<ul style="list-style-type: none"> Una inyección semanal (Interferón) + pastillas dos veces al día (ribavirina). 	Medicamentos	<ul style="list-style-type: none"> 1-3 pastillas una vez al día.
<ul style="list-style-type: none"> Alrededor de 12 meses. 	Tiempo de tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> Unos 2-3 meses.
<ul style="list-style-type: none"> En el mejor de los casos, 5 de cada 10 personas tratadas se curaban. 	Cura	<ul style="list-style-type: none"> Más de 9 de cada 10 personas tratadas se curan.
<ul style="list-style-type: none"> Depresión, fiebre, escalofríos, malestar estomacal, fatiga y falta de energía. 	Efectos secundarios	<ul style="list-style-type: none"> Por lo general, no hay efectos secundarios o dolores de cabeza leves o fatiga.

Puede volver a contraer la hepatitis C si no tiene cuidado. Para evitar la reinfección y mantenerse saludable, es importante que:

- **No** comparta agujas, jeringuillas, popotes (sorbetes) u otros instrumentos para inyectarse o inhalar drogas
- **No** comparta maquinillas de afeitar ni cepillos de dientes
- **Use condones** para prevenir la hepatitis C u otras infecciones de transmisión sexual
- **Siga visitando a su proveedor(es) de atención médica** con regularidad y hable de los riesgos de reinfección

